

# Szczepienia przeciwko COVID-19



## OGŁOSZENIE

### Szczepienie p/Covid-19

Katowickie Centrum Onkologii zaprasza na kontynuację szczepienia podstawowego p/Covid-19 ( III dawka uzupełniająca<sup>1</sup> i przypominająca<sup>2</sup>) szczepionką Comirnaty Pfizer – BioNTech.

#### Do szczepienia III dawką p/Covid-19 kwalifikują się:

##### 1. Dawka przypominająca

1. Osoby, które ukończyły 50 rok życia
2. Pracownicy ochrony zdrowia mający bezpośredni kontakt z pacjentem

- w odstępie nie szybciej niż 180 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia p/Covid-19 / lub 1-dawkowego Janssen

##### 1. Dawka dodatkowa / uzupełniająca

2. osoby z zaburzeniami odporności otrzymujących aktywne leczenie p/nowotworowe, z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności,
3. po przeszczepach przyjmujących leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne,
4. po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat,
5. z zakażeniem wirusem HIV,
6. leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną,
7. dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.

- w odstępie  $\geq 28$  dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia p/Covid-19<sup>3</sup>.

Punkt szczepień czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

#### **Kontakt:**

1. E-mail: [szczepienia@kco.katowice.pl](mailto:szczepienia@kco.katowice.pl)
2. Bezpośrednio w punkcie szczepień,
3. Telefonicznie: 324200351; 324200213;

Przed przystąpieniem do szczepień należy wypełnić Oświadczenie / Kwestionariusz dostępny poniżej w załączniku.

Prosimy aby do punktu szczepień zabrać ze sobą dowód osobisty, okulary (jeśli ktoś używa) oraz informację o przyjmowanych lekach.

---

<sup>1</sup> – Dawka dodatkowa uzupełniająca – podawana jest osobom z upośledzeniem odporności, u których odpowiedź immunologiczna na szczepienie mogła być niewystarczająca (podawana w celu osiągnięcia optymalnej ochrony).

<sup>2</sup> – Dawka przypominająca – podawana jest osobom zaszczepionych (te, które ukończyły podstawowy schemat szczepienia przeciwko COVID-19) w celu poprawy, utrwalenia, przedłużenia ochrony po szczepieniu.

3 – u osób w wieku  $\geq 18$  lat należy stosować szczepionki mRNA(Comirnaty Pfizer-BioNTech albo Spikevax Moderna), u dzieci 12-17 lat należy stosować szczepionkę Comirnaty Pfizer-BioNTech

Data utworzenia

30-09-2021 (Tomasz Duniec)

Data modyfikacji

30-11-2023 (Michał Pisula)

Data publikacji

30-09-2021

## Przegląd załączników

Lp.	Nazwa pliku	Rozmiar	Data dodania	Opublikował
1	<a href="#">Kwestionariusz - dorośli akceptacja MMM_EN (002)</a>	275.5 KB	30-09-2021	Tomasz Duniec
2	<a href="#">Kwestionariusz - małoletni ostateczna akceptacja MMM_EN.PL</a>	258.5 KB	30-09-2021	Tomasz Duniec
3	<a href="#">Kwestionariusz_wstepnego_wywiadu_przesiewowego_przed_szczepieniem_osoby_doroslej_przeciw_COVID_19</a>	885.7 KB	30-09-2021	Tomasz Duniec
4	<a href="#">Kwestionariusz_wstepnego_wywiadu_przesiewowego_przed_szczepieniem_osoby_maloletniej_przeciw_COVID_19</a>	588.2 KB	30-09-2021	Tomasz Duniec