

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:457342-2019:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne  
2019/S 188-457342**

**Sprostowanie**

**Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji**

**Dostawy**

**(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 180-437863)**

**Legal Basis:**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa i adresy**

Katowickie Centrum Onkologii  
Raciborska 26  
Katowice  
40-074  
Polska

Osoba do kontaktów: Witold Nowak

Tel.: +48 322511761

E-mail: [szpital@kco.katowice.pl](mailto:szpital@kco.katowice.pl)

Faks: +48 322514533

Kod NUTS: PL

**Adresy internetowe:**

Główny adres: <https://kco.ezamawiajacy.pl>

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

Zakup i dostarczanie leków 53 pakiety  
Numer referencyjny: KCO/PN/70/2019

**II.1.2) Główny kod CPV**

33600000

**II.1.3) Rodzaj zamówienia**

Dostawy

**II.1.4) Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie produktów leczniczych – leków i materiałów opatrunkowych dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii w postaciach, dawkach i szacunkowych ilościach, których wykaz w podziale na pakiety od nr 1 do nr 53 stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ – oferta cenowa.

Przedmiotem zamówienia jest produkt leczniczy – lek o nazwie międzynarodowej w określonej przez Zamawiającego postaci i dawce.

**Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

**VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

25/09/2019

**VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2019/S 180-437863](#)

**Sekcja VII: Zmiany**

**VII.1) Informacje do zmiany lub dodania**

**VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 1

Zamiast:

Pakiet 1

Paramagnetyczny środek kontrastowy o stężeniu gadolinu 1,0 mmol/ml do badań MR niskiego ryzyka wystąpienia nerkopochodnego włóknienia układowego (NSF) a 7,5 ml x 1 amp. strz./amp. ilość 200

Paramagnetyczny środek kontrastowy o stężeniu gadolinu 1,0 mmol/ml do badań MR niskiego ryzyka wystąpienia nerkopochodnego włóknienia układowego (NSF) a 15 ml x 1 fiol. ilość 650

Powinno być:

Pakiet 1

Alfacalcidol kaps. 0,25 mcg, 100 szt. ilość 50

Alfacalcidol kaps. 1,0 mcg, 100 szt. ilość 50

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 2

Zamiast:

Pakiet 2

Paramagnetyczny środek kontrastowy o stężeniu gadolinu 0,5 mmol/ml do badań MR niskiego ryzyka wystąpienia nerkopochodnego włóknienia układowego (NSF) a 15 ml x 1 fiol. ilość 350

Paramagnetyczny środek kontrastowy o stężeniu gadolinu 0,5 mmol/ml do badań MR niskiego ryzyka wystąpienia nerkopochodnego włóknienia układowego (NSF) a 20 ml x 1 fiol. ilość 200

Powinno być:

Pakiet 2

Clindamycinum 0,3 g, kaps., 16 kaps. ilość 120

Clindamycinum 0,6 g/4 ml inj., 1 amp. ilość 600

Clindamycinum 0,9 g/6 ml, inj., 1 amp. ilość 100

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 3

Zamiast:

Pakiet 3

Paramagnetyczny środek kontrastowy o stężeniu gadobenatu dimegluminy 0,5 mmol/ml dedykowany do badań MR wątroby, a 15 ml x 1 fiol. ilość 50

Powinno być:

Pakiet 3

Erytromycyn 0,2 g, tabl. powl., 16 tabl. ilość 80

Erytromycyn 0,5 %, maść do oczu, 5 mg/g, 3,5 g ilość 200

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 4

Zamiast:

Pakiet 4

Niejonowy, niskoosmolarny środek kontrastowy o stężeniu od 370 do 400 mg jodu inj. 10 but a 100 ml ilość 35

Niejonowy, niskoosmolarny środek kontrastowy o stężeniu od 370 do 400 mg jodu inj. 8 but a 500 ml ilość 15

Powinno być:

Pakiet 4

Escitalopram tabl. powl., 5 mg, 28 szt. ilość 50

Escitalopram tabl. powl., 10 mg, 28 szt. ilość 50

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 5

Zamiast:

Pakiet 5

Niejonowy, niskoosmolarny środek kontrastowy Środek kontrastujący niejonowy 300 mg/1 ml 1 but. a 500 ml inj. ilość 1500

Niejonowy, niskoosmolarny środek kontrastowy Środek kontrastujący niejonowy 300 mg/1 ml 1 but. a 100 ml inj. ilość 450

Niejonowy, niskoosmolarny środek kontrastowy Środek kontrastujący niejonowy 300 mg/1 ml 1 but. a 50 ml inj. ilość 250

Powinno być:

Pakiet 5

Glyceroli trinitras 0,4 mg/daw., aer., 11 g (200 dawek) ilość 20

Glyceroli trinitras 0,01 g/10 ml, rozt. do wl. doż., 10 amp. ilość 400

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 6

Zamiast:

Pakiet 6

Niejonowy, dimeryczny, sześćjodowy, rozpuszczalny w wodzie środek kontrastowy o stężeniu: 270 mg jodu/ml (co odpowiada: 550 mg/ml jodksanolu), inj. 10 but. a 100 ml ilość 250

Niejonowy, dimeryczny, sześćjodowy, rozpuszczalny w wodzie środek kontrastowy o stężeniu: 320 mg jodu/ml (co odpowiada: 652 mg/ml jodksanolu), inj. 10 but. a 200 ml ilość 100

Powinno być:

Pakiet 6

Immunoglobulinum humanum 5 g/100 ml, inj., 1 fiol. ilość 50

Immunoglobulinum humanum 10 g/200 ml, inj., 1 fiol. ilość 75

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 7

Zamiast:

Pakiet 7

Meglumini amidotrizoas rozt. do wl. doż., 10 fiol. a 100 ml ilość 50

Powinno być:

Pakiet 7

Labetalol 100 mg, 56 tabl. ilość 30

Labetalol 200 mg, 56 tabl. ilość 30

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 8

Zamiast:

Pakiet 8

Amoxicillinum 0,25 g/5 ml, gran. do p. zaw., 24 g/60 ml ilość 15

Amoxicillinum 1 g, tabl. powl. 16 szt. ilość 150

Amoxicillinum 0,5 g, tabl. powl. 16 szt. ilość 30

Powinno być:

Pakiet 8

Methylprednisolonum proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz. 40 mg, 1 fiol.+rozpuszczalnik, ilość 150

Methylprednisolonum proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz. 125 mg, 1 fiol.+rozpuszczalnik, ilość 150

Methylprednisolonum proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz. 250 mg, 1 fiol.+rozpuszczalnik, ilość 150

Methylprednisolonum proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz. 500 mg, 1 fiol.+rozpuszczalnik, ilość 150

Methylprednisolonum proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz. 1 000 mg, 1 fiol.+rozpuszczalnik, ilość 150

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 9

Zamiast:

Pakiet 9

Cellulose Surgicel Fibrillar, 2,5 x 5,1 cm x 10 szt. ilość 5

Cellulose Surgicel, 5 x 7,5 cm x 12 szt. ilość 10

Powinno być:

Pakiet 9

Methylrosanilinii chloridum 1 %, płyn, 20 ml ilość 15

Methylrosanilinii chloridum 1 %, płyn, 20 ml ilość 30

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 10

Zamiast:

Pakiet 10

Clindamycinum 0,3 g, kaps., 16 kaps. ilość 70

Clindamycinum 0,6 g/4 ml inj., 1 amp. ilość 400

Clindamycinum 0,9 g/6 ml, inj., 1 amp. ilość 10

Powinno być:

Pakiet 10

Perindoprilum 10 mg, tabl., 90 szt. ilość 100

Perindoprilum 5 mg, tabl., 90 szt. ilość 200

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 11

Zamiast:

Pakiet 11

Lactobacillus rhamnosus Lactid forte, kaps. 10 mld CFU, 10 szt. ilość 600

Lactobacillus rhamnosus Lactid forte, prosz. do sporz. zaw. doustnej 10 mld CFU, 10 saszetek ilość 60

Powinno być:

Pakiet 11

Prep. złoż Cavilon (Durable Barrier Cream) krem, tuba 92 g ilość 250

Prep. złoż Cavilon (No Sting Barrier Film), płyn 28 ml ilość 250

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 12

Zamiast:

Pakiet 12

Midazolam 15 mg/3 ml, rozt. do inj., 5 amp. a 3 ml ilość 80

Midazolam 50 mg/10 ml, rozt. do inj., 5 amp. a 10 ml ilość 35

Powinno być:

Pakiet 12

Valproate sodium proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz, 400 mg/4 ml, 4 fiołki + rozp. ilość 120

Valproate sodium, Valproic acid 300, 0,3 g, tabl. pow. 30 tabl. ilość 150

Valproate sodium, Valproic acid 500, 0,5 g, tabl. pow. 30 tabl. ilość 200

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 13

Zamiast:

Pakiet 13

Preparat złoż. Biphozyl, roztwór dializacyjny buforowany dwuwęglanem w nerkowej terapii zastępczej, 5 000 ml x 2 szt. ilość 3 000

Preparat złoż. Phoxilium, 1,2 mmol/l fosforanów, produkt złożony, roztwór do hemodializy i hemofiltracji, 5 000 ml x 2 szt. ilość 3 000

Preparat złoż. Priskasol K2 - roztwór do hemofiltracji i hemodializy, 5 000 ml x 2 szt. ilość 3 000

Preparat złoż. Priskasol K4 - roztwór do hemofiltracji i hemodializy, 5 000 ml x 2 szt. ilość 3 000

Preparat złoż. Regiocit, roztwór do hemofiltracji, 5 000 ml x 2 szt. ilość 3 000

Powinno być:

Pakiet 13 Amantadine sulphate roztw. do inf. 200 mg/500 ml ilość 300

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 14

Zamiast:

Pakiet 14

Saccharomyces boulardii Enterol 250, kaps. 250 mg, 50 szt. ilość 600

Saccharomyces boulardii Enterol 250, prosz. do sporz. zaw. doustnej 250 mg, 10 saszetek ilość 60

Powinno być:

Pakiet 14

Ambroxoli hydrochloride płyn do inhalacji 7,5 mg/1ml a 100 ml ilość 60

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 15

Zamiast:

Pakiet 15

Telmisartan tabl., 40 mg, 28 szt. ilość 40

Telmisartan tabl., 80 mg, 28 szt. ilość 40

Powinno być:

Pakiet 15

Bethamethasone valerate, Cloquinol krem, 1,22 mg+30 mg/1 g, 15 g ilość 10

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 16

Zamiast:

Pakiet 16

Vitamins Soluvit N, proszek do sporz. roztw. do inf., 10 fioł. ilość 80

Vitamins Vitalipid N Adult, konc. do sporz. emulsji do inf., 10 amp. a 10 ml ilość 80

Powinno być:

Pakiet 16

Citrate de coffeine 25 mg/1 ml, inj., 10 amp. a 2 ml ilość 15

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 17

Zamiast:

Pakiet 17

Voriconazolum tabl. powl., 50 mg, 20 szt. ilość 12

Voriconazolum tabl. powl., 200 mg, 10 szt. ilość 12

Powinno być:

Pakiet 17

Dexpanthenolum aerozol, 130 g ilość 90

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 18

Zamiast:

Pakiet 18 Dimetikon, Penetrol żel w sprayu, 60 ml, 1 szt. ilość 50

Powinno być:

Pakiet 18 Dimetylosulfotlenek 16,6 %, żel, 100 g ilość 50

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 19

Zamiast:

Pakiet 19 Ferri hydroxydum polysomaltosum 0,1 gFe<sup>+++</sup>/2 ml, inj. domięśniowe, 50 amp. ilość 15

Powinno być:

Pakiet 19 Dimethicone krople doustne, 980 mg/g, butelka 5 g ilość 50

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 20

Zamiast:

Pakiet 20 Immunoglobulinum humanum anty D 300 µg/2ml x 1 amp.-strzyk. ilość 300

Powinno być:

Pakiet 20 Dimetikon, Penetrol żel w sprayu, 60 ml, 1 szt. ilość 200

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 22

Zamiast:

Pakiet 22 Immunoglobulinum humanum anty D 50 µg/ml x 1 amp.-strzyk. ilość 200

Powinno być:

Pakiet 22 Dobutamine hydrochloride konc. do sporz. roztw. do inf. 50 mg/ml, 5 amp.a 5 ml. ilość 300

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 23

Zamiast:

Pakiet 23 Insulin Lispro roztw. do wstrz., 100 j.m./ml, 10 wkł. a 3 ml ilość 20

Powinno być:

Pakiet 23 Factor II, Factor VII, Factor IX, Factor X, Protein C, Protein S 500 j.m, proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz. 1 fiol.+ rozp. 20 ml ilość 50

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 21

Zamiast:

Pakiet 21 Immunoglobulinum humanum anty D 150 µg/ml x 1 amp.-strzyk. ilość 200

Powinno być:

Pakiet 21 Diosmine, Hesperidinum 500 mg, tabl. powl., 60 tabl. ilość 220

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 24

Zamiast:

Pakiet 24 Ketamine hydrochloride roztw. do wstrz., 10 mg/ml, 5 fiolek 20 ml ilość 16

Powinno być:

Pakiet 24 Fibrinogen 1 g, proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf., 1 fiol. ilość 50

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 25

Zamiast:

Pakiet 25 Natrium chloratum r-r NaCl do irygacji 500 ml ilość 300

Powinno być:

Pakiet 25 Immunoglobulinum humanum anty D 150 µg/ml x 1 amp.-strzyk. ilość 120

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 26

Zamiast:

Pakiet 26 Neostygmmini methylysulfas 0,5 mg/1 ml, amp., 10 szt. ilość 60

Powinno być:

Pakiet 26 Immunoglobulinum humanum anty D 50 µg/ml x 1 amp.-strzyk. ilość 120

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 27

Zamiast:

Pakiet 27 Ornithini aspartas granulata do sporz. roztw. doustnego 3 g/5 g, 30 sasz. ilość 350

Powinno być:

Pakiet 27 Isoniazidum 100 mg x 250 tabl. ilość 10

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 28

Zamiast:

Pakiet 28 Propofolum 2 % MCT/LCT, 0,02 g/1 ml, rozt. do wl. doz., 1 amp. a 50 ml ilość 350

Powinno być:

Pakiet 28 Itopride hydrochloride 50 mg, tabl. 100 szt. ilość 50

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 29

Zamiast:

Pakiet 29 Sodium glycerophosphate Glycophos, konc. do sporz. roztw. do inf., 216 mg/ml, 10 fiolek 20 ml ilość 60

Powinno być:

Pakiet 29 Orciprenaline sulphate 5 mg/10 ml x 5 amp. ilość 60

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 30

Zamiast:

Pakiet 30 Vaccinum diphtheriae 0,5 ml 1 amp.-strz. ilość 200

Powinno być:

Pakiet 30 Phenobarbital inj. 40 mg/2ml x 1 fiol. ilość 20

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 31

Zamiast:

Pakiet 31 Vaccinum varicellae vivum 2000 j PFU/daw., 1 amp.-strz. ilość 40

Powinno być:

Pakiet 31 Phenoxymethylpenicillin tabl. 1 500 000 j.m, 12 szt. ilość 25

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 32

Zamiast:

Pakiet 32

Aqua pro iniectione inj. fl., 500 ml (tw. szt., butelka) ilość 1 200

Aqua pro iniectione inj. fl., 250 ml (tw. szt., butelka) ilość 400

Powinno być:

Pakiet 32 Povidone-Iodine maść, 100 mg/g, tuba 20 g ilość 150

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 33

Zamiast:

Pakiet 33

Dextran 40 000, 10 % inj. 500 ml ilość 50

Powinno być:

Pakiet 33 Polymyxini B sul.+Oxytetracy.+Hydrocort zawiesina, 5 ml ilość 250

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 34

Zamiast:

Pakiet 34

Glucosum 5 % inj. 250 ml (worek) ilość 1 000

Glucosum 5 % inj. 500 ml (worek) ilość 4 500

Glucosum 5 % inj. 1 000 ml (worek) ilość 1 000

Powinno być:

Pakiet 34 Prep. złoż. PC 30 V, liquidum, płyn 100 ml ilość 300

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 35

Zamiast:

Pakiet 35

Glucosum 5 % inj. 250 ml (worek)\* ilość 250

Glucosum 5 % inj. 500 ml (worek)\* ilość 3 500

\* worek zaopatrzony w bezigłowy system do przygotowywania leków do podaży dożylniej

Powinno być:

Pakiet 35 Prep. złoż. Granudacyn, płyn na skórę 500 ml ilość 500

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 36

Zamiast:

Pakiet 36



Glucosum 10 % inj. 100 ml ilość 200

Glucosum 10 % inj. 250 ml ilość 200

Glucosum 10 % inj. 500 ml ilość 500

Powinno być:

Pakiet 36 Prep.złoż. Microdacyn 60 Wound Care, płyn 500 ml ilość 500

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 37

Zamiast:

Pakiet 37

Hydroxyethylamylum 10 %, rozt. do infuzji, 500 ml ilość 300

Hydroxyethylamylum, natrii chloridum rozt. do infuzji, 500 ml ilość 300

Powinno być:

Pakiet 37 Prep. złoż. SutriSept, płyn na skórę 250 ml ilość 500

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 38

Zamiast:

Pakiet 38

Mannitolum 15 % LZ, 0,2 g/1 ml, rozt. do wl. doż., 100 ml (worek) ilość 1 500

Mannitolum 15 % LZ, 0,2 g/1 ml, rozt. do wl. doż., 250 ml (worek) ilość 1 500

Powinno być:

Pakiet 38 Prednisoloni pivalas 0.5 % krem, 10 g ilość 150

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 39

Zamiast:

Pakiet 39

Mannitolum, Sorbitolum SM Diluted, rozt., 5 l ilość 80

Powinno być:

Pakiet 39 Ranitidinum 0,05 g/5 ml, inj., 5 amp. ilość 600

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 40

Zamiast:

Pakiet 40

Natrii chlor. Kalii chlor. Calcii chlor. inj. fl., 500 ml ilość 1 200

Powinno być:

Pakiet 40 Salmoterolum 25 mcg, aerozol wziew., 120 daw. ilość 50

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 41

Zamiast:

Pakiet 41

Natrii chloridum 0,9 % inj., 100 ml (worek) ilość 18 000

Natrii chloridum 0,9 % inj., 250 ml (worek) ilość 18 000

Natrii chloridum 0,9 % inj., 500 ml (worek) ilość 15 000

Natrii chloridum 0,9 % inj., 1 000 ml (worek) ilość 1 000

Powinno być:

Pakiet 41

Sodium polystyrene sulfonate proszek doustny lub do sporz. zaw. doodbytniczej, 1,42 g Na+/15 g, 454 g ilość 30

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 42

Zamiast:

Pakiet 42

Natrii chloridum 0,9 % inj., 50 ml (worek)\* ilość 800

Natrii chloridum 0,9 % inj., 100 ml (worek)\* ilość 1 500

Natrii chloridum 0,9 % inj., 250 ml (worek)\* ilość 5 000

Natrii chloridum 0,9 % inj., 500 ml (worek)\* ilość 10 000

Natrii chloridum 0,9 % inj., 1 000 ml (worek)\* ilość 4 000

\* worek zaopatrzony w bezigłowy system do przygotowywania leków do podaży dożylniej

Powinno być:

Pakiet 42 Sulphac blue Patent Blau, 25 mg/ml, inj., 5 amp. a 2 ml ilość 100

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 43

Zamiast:

Pakiet 43

Natrii chloridum 0,9 % inj., 500 ml (butelka) ilość 1 000

Powinno być:

Pakiet 43 Terlipressinum 0,1 mg/1 ml, inj., 5 amp.a 8,5 ml ilość 15

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 44

Zamiast:

Pakiet 44

Prep. złoż. Płyn fizj. wieloelektrolitowy, inj., 500 ml ilość 15 000

Powinno być:

Pakiet 44 Glucosum Glucosum 40 %, roztw. do inf., 400 mg/ml, worek 500 ml ilość 500

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 45

Zamiast:

Pakiet 45

Prep. złoż. Preparat do żywienia pozajelitowego przystosowany do podania przez żyły obwodowe, worek 3-komorowy. Osmolarność od 750 do 850 mOsm/l, całkowita wartość energetyczna od 600 do 960 kcal, skład: białka od 20 do 40 g, tłuszcze od 20 do 50 g, węglowodany od 75 do 85 g, azot od 3,5 do 6,0 g i inne elektrolity. Pojemność od 1 000 do 1 250 ml x 1 szt. ilość 80

Powinno być:

Pakiet 45 Olive oil, Soybean oil ClinOleic 20 %, emulsja do inf., 250 ml ilość 500

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 46

Zamiast:

Pakiet 46 - Kompres Grassolind, 7,5 x 10 cm, opatr., 10 szt. ilość 30

Powinno być:

Pakiet 46 Prep.złoż. Preparat do żywienia pozajelitowego przystosowany do podania przez żyły obwodowe, worek 3 – komorowy. Osmolarność od 750 do 850 mOsm/l, całkowita wartość energetyczna od 600 do 960 kcal,

skład: białka od 20 do 40 g, tłuszcze od 20 do 50 g, węglowodany od 75 do 85 g, azot od 3,5 do 6,0 g i inne elektrolity. Pojemność od 1 000 do 1 250 ml x 1 szt. ilość 720

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 47

Zamiast:

Pakiet 47 - ElastoNasal, 7 cm x 7,1 cm, 50 szt. ilość 150

Powinno być:

Pakiet 47

Prep. złoż. SmofKabiven Extra Nitrogen, emulsja do inf., 1 012 ml ilość 200

Prep. złoż. SmofKabiven Extra Nitrogen, emulsja do inf., 1 518 ml ilość 200

Prep. złoż. SmofKabiven Extra Nitrogen, emulsja do inf., 2 025 ml ilość 200

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 48

Zamiast:

Pakiet 48

— Codofix Plus P1, siatka opatrunkowa, 25 m ilość 80

— Codofix Plus P2, siatka opatrunkowa, 25 m ilość 80

— Codofix Plus P3, siatka opatrunkowa, 25 m ilość 80

— Codofix Plus P4, siatka opatrunkowa, 25 m ilość 80

— Codofix Plus P5, siatka opatrunkowa, 25 m ilość 80

Powinno być:

Pakiet 48 Prep. złoż. Aminosteril N-Hepa 8 %, rozw. do inf. 500 ml ilość 500

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 49

Zamiast:

Pakiet 49

— Opatrunek Granuflex 10 x 10 cm, 10 szt. ilość 150

— Opatrunek Granuflex Extra Thin, 10 x 10 cm, 5 szt. ilość 150

Powinno być:

Pakiet 49 Prep. złoż. Nephrotec, rozw. do inf. 500 ml ilość 500

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**